

N	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
	<i>Operatore abilitato ai rilievi biometrici</i>			
1	Nella stagione del prelievo in braccata del cinghiale, per semplificare le operazioni di classificazione dell'età dalla dentatura, quante classi di età è bene utilizzare?	6	4	3
2	A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimandibola di un capriolo?	10	9	11
3	I rilievi appuntiti sulla superficie triturante dei premolari e molari dei selenodonti si chiamano:	Punte	Cuspidi	Apici
4	Quali denti, nel cinghiale, sono robusti, potenti e atti a tagliare e frammentare il cibo?	Gli incisivi	I premolari	I molari
5	Quando vengono sostituiti tutti i premolari da latte con quelli definitivi nel capriolo?	Fra il 7° ed il 9° mese di vita	Fra il 9° ed il 12° mese di vita	Fra il 12° ed il 14° mese di vita
6	Quale dente, nel cinghiale, è separato dagli altri, più piccolo e in alcuni individui può mancare del tutto?	Il terzo incisivo (I3)	Il canino	Il primo premolare (P1)
7	Dall'esame della dentatura, a quale arco di età corrisponde la classe 3, utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata?	Da 0 a 15 mesi	Da 16 a 27 mesi	Oltre i 27 mesi
8	Dall'esame della dentatura, a quale arco di età corrisponde la classe 1, utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata?	Da 0 a 15 mesi	Da 16 a 27 mesi	Oltre i 27 mesi
9	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini, 6 incisivi	Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini	Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari
10	Quanti sono i premolari nella emimandibola di un cinghiale adulto?	2.	3	4
11	Quale delle seguenti affermazioni, riferite al cinghiale, è corretta?	Nella mandibola ci sono 18 denti	Nella mandibola ci sono 20 denti	Nella mandibola ci sono 22 denti
12	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	Nella mandibola di un cervo ci sono 16 denti	Nella mandibola di un cervo ci sono 18 denti	Nella mandibola di un cervo ci sono 20 denti
13	Quale delle seguenti affermazioni riferita al daino è corretta?	I premolari definitivi erompono prima dei canini	I premolari definitivi erompono dopo i molari	I premolari definitivi erompono prima dei molari
14	Quali denti, della dentatura del cinghiale, sono tipicamente buonodonti, provvisti di tubercoli a forma di isolette sporgenti sulla superficie del dente?	Gli incisivi	I premolari	I molari
15	Per effettuare quale tipo di valutazione si utilizza della lunghezza della mandibola?	Per valutare il grado di purezza genetica della popolazione studiata	Per valutare se il rapporto sessi e classi di età della popolazione studiata sono corretti	Per valutare la qualità dell'ambiente e la densità della popolazione studiata
16	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 28° ed il 32° mese di vita	La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 34° ed il 38° mese di vita	La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 43° ed il 46° mese di vita
17	Che cos'è l'apertura nella misurazione di un trofeo di capriolo ?	La minima apertura tra le facce interne delle stanghe	La massima apertura tra le facce interne delle stanghe	La massima apertura tra le facce esterne delle stanghe
18	Quando vengono sostituiti tutti i premolari da latte con quelli definitivi nella dentatura di un cervo?	Fra il 12° ed il 15° mese di vita.	Fra il 16° ed il 20° mese di vita	Fra il 21° ed il 25° mese di vita
19	Perché si analizza lo stato dei tratti riproduttivi con esame dei corpi lutei o conteggio degli embrioni/feti?	Soddisfare una legittima curiosità del cacciatore	Valutare esclusivamente la correttezza dell'abbattimento in termini di classi di sesso	Valutare la condizione delle popolazioni in esame e costruire modelli demografici predittivi
20	A che età compaiono i primi molari (M1) nel capriolo?	A circa 3-4 mesi di età	A circa 7-8 mesi di età	A circa 12-14 mesi di età
21	A che età avviene la sostituzione del terzo premolare da latte con quello definitivo nel daino?	12 - 14 mesi	16 - 18 mesi	19 - 22 mesi
22	Nella stima dell'età dalla dentatura della popolazione di cinghiale prelevata, che rischio si corre utilizzando le classi semestrali (es. da 0 a 6, da 6 a 12 mesi, ecc.)?	Di assegnare i giovani alle classi adulte	Di assegnare alla medesima classe, individui nati in annate riproduttive differenti	Di assegnare a classi d'età diverse, individui nati nella stessa annata riproduttiva
23	Che cos'è la "biometria"?	La scienza che studia una popolazione in base ai comportamenti	La scienza che studia un ambiente partendo dalle variabili delle componenti abiotiche	La scienza che studia una popolazione partendo dalle variabili morfologiche degli individui.
24	In quale arco di età vengono sostituiti tutti i premolari da latte con i definitivi nel muflone?	Fra il 16° ed il 20° mese di vita	Fra il 21° ed il 25° mese di vita	Fra il 26° ed il 32° mese di vita
25	Quale misurazione biometrica si rileva partendo dalla radice e terminando in corrispondenza dell'ultima vertebra caudale, escludendo i peli?	La lunghezza del garretto	La lunghezza testa tronco	La lunghezza della coda
26	Quale delle seguenti affermazioni, riferita al muflone, è corretta?	Per determinare l'età dei maschi, occorre individuare e conteggiare il numero di anelli di ornamento presenti sul trofeo	Per determinare l'età dei maschi, occorre individuare e conteggiare il numero di anelli di pausa della crescita presenti sul trofeo	Per determinare l'età dei maschi, occorre valutare la lunghezza delle corna
27	Come si chiama lo spazio senza denti situato fra i canini ed i premolari nella mandibola dei ruminanti?	Spazio interdentale	Diastema	Diadema
28	Quale misurazione biometrica si rileva partendo dal punto più avanti e seguendo le curve dell'animale lungo la linea mediana dalla testa a tutto il dorso?	La lunghezza del garretto	La lunghezza testa tronco	La lunghezza della coda
29	A quanti mesi inizia il vero e proprio sviluppo delle corna nei piccoli di muflone?	Dal secondo mese	Dal terzo mese	Dal quarto mese
30	A che età compaiono i primi molari (M1) nella dentatura di un cervo?	Alla nascita	A circa 4-5 mesi di età	A circa 12-13 mesi di età
31	Nei cervidi e nei bovidi selvatici presenti nella nostra regione, da quale elemento è caratterizzato il terzo premolare da latte (Pd3)?	Dall'essere privo delle strisce di dentina	Dall'essere costituito da due cuspidi (bicuspidato)	Dall'essere costituito da tre cuspidi (tricuspidato)
32	Nel corso di quale periodo nei maschi di muflone si verifica il maggiore incremento della massa cornuale?	Nel corso del primo semestre	Nel corso del primo anno	Nel corso del secondo anno
33	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 10 mesi di età	La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 14 mesi di età	La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 20 mesi di età
34	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 18 mesi di età	La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 20 mesi di età	La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 26 mesi di età
35	Qual è lo scopo prevalente dell'esame dello stato della dentatura e della dentizione, che consente la determinazione dell'età dei capi abbattuti?	Valutare esclusivamente la correttezza dell'abbattimento in termini di classi di età	Valutare esclusivamente la correttezza dell'abbattimento in termini di sesso e classi di età.	Valutare la correttezza del prelievo e la struttura d'età della porzione di popolazione prelevata
36	A che età avviene la sostituzione del terzo premolare da latte con quello definitivo nel cervo?	12-14 mesi	16-18 mesi	22-24 mesi
37	Una volta terminata la sostituzione-eruzione di tutti i denti, qual è l'unico elemento di valutazione dell'età dalla dentatura?	Il grado di usura del diastema	Il grado di usura dei denti	Il cambio di inclinazione dei denti
38	Quale delle seguenti affermazioni (riferite al cinghiale) è corretta?	La dentatura definitiva viene completata a circa 2 anni di età	La dentatura definitiva viene completata a circa 30 mesi di età	La dentatura definitiva viene completata a circa 3 anni di età
39	A che età avviene la sostituzione del terzo premolare da latte con quello definitivo nel capriolo?	12-14 mesi	16-18 mesi	22-24 mesi
40	In che cosa consiste fondamentalmente il compito del rilevatore biometrico?	Nell'eseguire una serie di verifiche e rilevamenti sul capo prelevato, compilando con cura la scheda biometrica	Nell'eseguire una serie di verifiche e rilevamenti sul capo prelevato, archiviandole immediatamente su supporto informatico	Nell'eseguire una serie di verifiche e rilevamenti sul capo prelevato, archivarle ed effettuare le necessarie elaborazioni statistiche
41	Qual'è l'ultimo dente da latte ad essere sostituito (contemporaneamente all'eruzione del terzo molare) nel cinghiale?	Il quarto premolare (P4)	Il primo incisivo (I1)	Il secondo incisivo (I2)
42	Quale elemento completa il monitoraggio dei capi abbattuti nel caso dei maschi?	La misurazione e valutazione della circonferenza del collo	La misurazione e valutazione dei trofei	La misurazione e valutazione delle mandibole
43	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	La dentatura definitiva di un cervo viene completata entro i 18 mesi di età.	La dentatura definitiva di un cervo viene completata oltre i 24 mesi di età	La dentatura definitiva di un cervo viene completata oltre i 30 mesi di età
44	Da che cosa sono separate le cuspidi guanciali da quelle linguali e che cosa avviene col tempo?	Da "strisce di dentina" che col tempo diventano sempre più spesse	Da una "fessura" che col tempo diventa sempre più sottile.	Da una "fessura" che col tempo diventa sempre più spessa
45	Quali denti, nel cinghiale, sono grandi e sporgenti; quelli superiori sono ripiegati verso l'esterno e verso l'alto?	Gli incisivi	I canini	I premolari
46	Nei piccoli di daino a quanti mesi si verifica l'eruzione del primo molare?	È presente alla nascita	A circa 3 - 4 mesi	A circa 6 - 7 mesi
47	Durante i primi anni di vita degli ungulati selvatici qual è l'elemento più valido di individuazione della classe di età?	Lo spessore delle strisce di dentina	La valutazione del grado di usura dei denti	L'ordine di sostituzione-eruzione dei vari denti
48	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	Nella mandibola di un muflone ci sono 14 denti	Nella mandibola di un muflone ci sono 16 denti	Nella mandibola di un muflone ci sono 20 denti
49	Quale misurazione biometrica si rileva dalla punta dello zoccolo alla tuberosità del calcagno, sul lato esterno?	La lunghezza del garretto	L'altezza al garrese.	La lunghezza della coda.
50	Quanti sono i denti nella dentatura completa dei bovidi?	44	34	32
51	Quali denti, nel cinghiale ben sviluppati a forma di scalpello, vengono usati per estrarre gli alimenti dal terreno durante le operazioni di scavo".	Gli incisivi	I canini	I premolari
52	In quale arco di età avviene la sostituzione di tutti i premolari da latte con quelli definitivi nella dentatura di un daino?	Fra il 12° ed il 15° mese di vita	Fra il 16° ed il 20° mese di vita.	Fra il 21° ed il 26° mese di vita.
53	Il camoscio alla nascita possiede:	20 denti da latte	22 denti da latte	16 denti da latte
54	La sostituzione dei denti da latte e la crescita dei molari nel camoscio:	si completano a 36 mesi d'età	si completano a 45 mesi d'età	si completano a 48 mesi d'età
55	Quale delle seguenti affermazioni relative al camoscio è corretta?	A 4 anni e 4 mesi: tutti i denti definitivi sono presenti	A 5 anni: non sono ancora presenti tutti i denti definitivi	A 3 anni e 4 mesi: tutti i denti definitivi sono presenti

56	Nel camoscio dopo i 16 anni l'età si valuta essenzialmente:	contando gli anelli di accrescimento delle corna	misurando la lunghezza delle corna e l'eruzione dei denti	valutando l'usura dei canini e premolari
57	Il primo anello di accrescimento nelle corna del camoscio adulto	è ben visibile	non è più visibile	è visibile e molto vicino al secondo anello
58	Le corna della femmina di camoscio rispetto a quelle di un maschio sono:	più sottili e meno uncinatate	meno sottili e più uncinatate	non ci sono sostanziali differenze
59	Quale affermazione relativa alle corna di camoscio è corretta?	dopo i 2 anni la crescita è di pochi millimetri	tra il secondo e il terzo anno la crescita è di 3-3,5 centimetri	dopo il quarto anno la crescita è di 4 millimetri
60	Nella dentatura del camoscio a che età si trovano solo 4 incisivi definitivi?	4 anni	2 anni	1 anno
61	la circonferenza massima nelle corna del camoscio senza residui di resina normalmente viene misurata	all'apice	alla base	a metà
62	la circonferenza massima nelle corna del muflone normalmente viene misurata	all'apice	alla base	a metà
63	nel rilievo biometrico in quale cervide non bisogna prendere la circonferenza della stanga?	capriolo	cervo	daino
64	nel rilievo biometrico in quale ungulato non va presa la misura della circonferenza della rosa?	daino	cervo	camoscio
65	nel palco del cervo quale punta in molti casi è mancante?	oculare	ago	mediano
66	nel rilievo biometrico del palco del capriolo che misura non bisogna rilevare?	numero punte	circonferenza rosa	circonferenza stanga
67	nel rilievo biometrico del palco del capriolo che misura non bisogna rilevare?	lunghezza stanga	lunghezza punte	circonferenza rosa
68	in quale cervide nelle schede biometriche non troveremo la voce lunghezza coda?	daino	cervo	capriolo
69	nella mandibola dei cervidi quanti incisivi sono presenti?	10	8	6
70	la lunghezza massima delle corna del muflone viene rilevata	internamente	esternamente	lateralmente
71	nel trofeo del capriolo possiamo trovare	oculare,ago,mediano	oculare,mediano,vertice	oculare,vertice,stocco
72	in quale cervide può essere presente la corona?	capriolo	cervo	daino
73	in quale ungulato troveremo sicuramente la dentatura completa all'età di 2 anni?	muflone	camoscio	capriolo
74	nel daino adulto le misure da rilevare nella pala sono	larghezza e spessore	lunghezza e larghezza	lunghezza e numero punte
75	le punte che ci aspettiamo di trovare nel daino adulto sono	oculare e mediano	oculare e ago	oculare e stocco